



ORIGINAL

Motivación y conocimiento de la solicitud y significado de los resultados del cribado de drogas de abuso en orina[☆]

Bartomeu Castanyer Puig^a, Bernardí Barceló Martín^a, Josep M. Queraltó Compañó^{b,*}, Rosa Díaz García^c, Carme Farré Masip^d, Elena Llorente Fernández^e y Ana Argudo^f

^a Servicio de Análisis Clínicos, Hospital Universitari Son Espases, Palma de Mallorca, España

^b Servei de Bioquímica, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España

^c Servicio de Análisis Clínicos, Hospital Xeral, Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo, España

^d Servei de Bioquímica, Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat, Barcelona, España

^e Servicio de Análisis Clínicos, Hospital Álvarez Buylla, Mieres, Asturias, España

^f Laboratori Clínic, Hospital Universitari de Bellvitge, Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

Recibido el 23 de enero de 2012; aceptado el 3 de abril de 2012

Disponible en Internet el 27 de julio de 2012

PALABRAS CLAVE

Drogas de abuso;
Análisis;
Cribado;
Intoxicaciones

Resumen

Objetivos: Este estudio pretende evaluar el grado de conocimiento que poseen los médicos para solicitar al laboratorio las determinaciones de drogas de abuso en orina (DAU) por inmunoanálisis, concretamente si es confirmar o excluir una impresión diagnóstica y objetivar el grado de conocimiento que poseen sobre el significado del punto de corte.

Material y método: Se diseñó una encuesta que constaba de 4 preguntas, 2 haciendo referencia a la motivación de la solicitud de los inmunoanálisis de DAU y 2 al significado del punto de corte. El periodo de recogida fue mayo y junio de 2010 y como requisito de los encuestados solo se consideró que realizasen su trabajo en un servicio de urgencias hospitalario.

Resultados: De 244 encuestas. 199 se consideraron válidas. Un 82,9% de los encuestados realizan

ar una impresión diagnóstica

In 68,3% realiza la solicitud

In 31,6% no las utiliza nunca

e un resultado positivo y un

**Documento completo
sólo para socios de AEFA**

[☆] Hospitales participantes (Comunidad): Hospital Álvarez Buylla (Asturias), Hospital Universitari son Espases (Balears), Hospital de Badalona (Catalunya), Hospital Sant Joan de Deu (Catalunya), Hospital Clínic (Catalunya), Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Catalunya), Hospital de Galdakao (Euskadi), Hospital CHUVI-Xeral (Galicia), Hospital 12 de Octubre (Madrid), Hospital Severo Ochoa (Madrid), Hospital Virgen de la Arrixaca (Murcia).

* Autor para correspondencia.

Correos electrónicos: tomeu.castanyer@ssib.es (B. Castanyer Puig), bernardino.barcelo@ssib.es (B. Barceló Martín), jqueralto@santpau.cat (J.M. Queraltó Compañó), rosa.diaz.garcia@sergas.es (R. Díaz García), farre@hsjdbcn.org (C. Farré Masip), helenllore@hotmail.com (E. Llorente Fernández), aargudo@bellvitgehospital.cat (A. Argudo).